

KIRTELPRØVESVAR

M

mikrokokker, mest stress-relateret da bakterien er normal på hudoverfladen. Behandling kun påkrævet ved synlige forandringer i mælken ellers kan det ikke betale sig og det er bedre at slagte koen

SA

stafylokokkus aureus: Smitter mest i robotterne/malkeanlæg, gemmer sig i yvervæv og er derfor kun behandlingskrævende ved synlig forandring. Unge dyr skal normalt have forlænget behandlingen til 5 dage (efter aftale med dyrlægen) men ældre køer skal slagtes på sigt da de bliver ved med at være smittefarlige.

Mr

mikrokokker, resistent overfor penicillin

Sr

stafylokokkus aureus, resistent overfor penicillin

SD

streptokokkus dysgalactiae, normal miljøbakterie, standard

K

Klebsiella, koen er meget syg, ligner coli men koen dør normalt.

E

Enterokokker, miljøforurening (husk grundig aftørring af patten inden prøveudtagning), behandling kun påkrævet ved synlige forandringer af mælken ellers kan det ikke betale sig

SU

streptokokkus uberis, standard behandling skal eventuelt gentages, da den kan være ret svær at få væk ved første behandling

C

E.coli, 2 muligheder: koen er ikke påvirket, så har hun selv klaret behandling og skal ikke behandles yderligere, eller koen er syg og kræver et dyrlægebesøg

AP

arcanobacter pyogenes. Fluestik, lugter og kirtlen ofte ikke til at redde

G

gær, ikke behandlingskrævende, forsvinder af sig selv, men der kan gå lang tid.

Sum

streptokokkus uberis mucoid, Anden form for uberis, der er sværere at behandle.